

# ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ (DME)

**ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ** μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν κάποιες επιπλοκές στους οφθαλμούς, όπως ο καταρράκτης, η διαβητική αμφιβλητορειδόπαθεια και το Διαβητικό Οίδημα της ωχράς κηλίδας. Συν την πραγματικότητα, το Διαβητικό Οίδημα της ωχράς κηλίδας φαίνεται να αποτελεί την κύρια αιτία απώλειας της όρασης σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Είναι ένα σημαντικό θέμα για τη δημόσια υγεία, καθώς περίπου το 2% των διαβητικών ασθενών αναπτύσσει Διαβητικό Οίδημα της ωχράς κηλίδας ανά έτος. Η συχνότητα εμφάνισης του είναι πιθανό να αυξηθεί λόγω της αύξησης της εμφάνισης του Σακχαρώδους Διαβήτη στην

Ευρώπη. Είναι γεγονός ότι η συχνότητα του Σακχαρώδους Διαβήτη τα τελευταία τριάντα χρόνια στην Ελλάδα έχει τριπλασιαστεί (το 1970 2,5%, σήμερα πάνω από 8%, με τον αριθμό των διαβητικών σήμερα στην Ελλάδα να είναι από 800.000 έως

Οι εξελίξεις στην παθολογία και τη χειρουργική του αμφιβλητορειδούς είναι ραγδαίες σε σχέση με τις θεραπευτικές μεθόδους που εφαρμόζονται προ 15ετίας

## Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς - Αμφιβλητορειδούς

Η Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς - Αμφιβλητορειδούς ιδρύθηκε το 2005. Ο σκοπός της είναι η διαφάνεια ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων αφθαλμάτρων, ειδικευμένων και ειδικών, νέων και παλισιότερων, διοργανώνοντας το επίσημο συνέδριο της κάθε λανουάριο από το 2006. Από φέτος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας προστέθηκαν και δύο φροντιστηριακές ημέρες, μία εαρινή, η οποία γίνεται στην Αθήνα στις 3 Μαΐου

2014 με θέμα την παθολογία του αμφιβλητορειδούς και τη σύγχρονη τεχνολογία και μια φθινοπωρινή, που θα γίνει στον Βόλο στις 8 Νοεμβρίου 2014 με θέμα: Το σύγχρονο «παρελθόν». Στην πλόγω φροντιστηριάκη ημερίδα θα παρουσιαστούν θέματα από διασκεψήμενούς συναδέψηρους, οι οποίοι θα συγκρίνουν τις θεραπευτικές μεθόδους και τις χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται προ 15ετίας και παλισιότερα με αυτές που εφαρμόζονται σήμερα. Οι εξελίξεις τόσο στην παθολογία όσο και στη χειρουργική του αμφιβλητορειδούς είναι ραγδαίες τα

τελευταία χρόνια, καθιστώντας την ημερίδα ρόδασημα για τη μετή της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς - Αμφιβλητορειδούς και τους νέους οφθαλμάτρους.

## Σκεύασμα παρατεταμένης αποδέσμευσης δεξαμεθαζόνης

Στο πλαίσιο της φροντιστηριακής ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Αμφιβλητορειδούς - που θα γίνει στον Βόλο στις 8.11.2014, θα παρουσιαστούν τα δεδομένα που σδημογράφησαν στην έγκριση του σκευάσματος παρατεταμένης αποδέσμευσης δεξαμεθαζό-

νης της εταιρείας ALLERGAN από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς υγείας για χρήση στο Διαβητικό Οίδημα της ωχράς κηλίδας. Το σκεύασμα αυτό είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εφαρμογής, προγειωμένο με ένα καινοτόμο βιοδιασπώμενο εμφύτευμα που απειλείθερως δεξαμεθαζόνη (ένα αντιφλεγμονώδες κορτικοστεροειδές). Το εμφύτευμα εγκένεται στο πίσω μέρος του οφθαλμού και διαλύεται αργά απειλεύθερων ντας δεξαμεθαζόνη που επειθαρέως στον αμφιβλητορειδό για περίσσο αρκετά μηνά, μενώντας το οίδημα της ωχράς κηλίδας και βεβιτώντας την

οπισθιά οιδύπτα. Οι ως τώρα διαθέσιμες φαρμακευτικές θεραπείες απαιτούσαν μηνιαία παρακολούθηση και συχνή επανάληψη. Αποτελεσματικές θεραπείες με μεωρέμενη συχνότητα χορήγησης, όπως το σκεύασμα παρατεταμένης αποδέσμευσης δεξαμεθαζόνης, μπορούν να είναι επωφελείς για τους ασθενείς, τους φροντιστές τους και το σύστημα υγείας.

